

# Paracetamol Lekarna Ljubljana 500 mg svečke

## paracetamol

**Pred uporabo natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!**

Zdravilo je na voljo brez recepta. Kljub temu ga morate uporabljati pazljivo in skrbno, da vam bo kar najbolj koristilo.

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Posvetujte se s farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije ali nasvet.
- Ne uporabljajte svečk Paracetamol Lekarna Ljubljana za znižanje zvišane temperature več kot 3 dni in za lajšanje bolečin več kot 5 dni. Če se znaki vaše bolezni v tem času ne izboljšajo, se posvetujte z zdravnikom.
- Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

**Navodilo vsebuje:**

1. Kaj je zdravilo Paracetamol Lekarna Ljubljana in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Paracetamol Lekarna Ljubljana
3. Kako uporabljati zdravilo Paracetamol Lekarna Ljubljana
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Paracetamol Lekarna Ljubljana
6. Dodatne informacije

### 1. KAJ JE ZDRAVILO PARACETAMOL LEKARNA LJUBLJANA IN ZA KAJ GA UPORABLJAMO

Zdravilo Paracetamol Lekarna Ljubljana vsebuje zdravilno učinkovino **paracetamol**. Deluje tako, da znižuje povišano telesno temperaturo (antipiretično) ter lajša blage do zmerne bolečine (analgetično).

**Zdravilo Paracetamol Lekarna Ljubljana se uporablja za:**

- zniževanje povišane telesne temperature,
- lajšanje blagega do zmerne glavobola ali zobobola,
- lajšanje bolečin v mišicah in sklepih pri gripi in prehladu,
- lajšanje bolečin pri poškodbah in po manjših kirurških posegih.

### 2. KAJ MORATE VEDETI, PREDEN BOSTE UPORABILI ZDRAVILO PARACETAMOL LEKARNA LJUBLJANA

**Ne uporabljajte zdravila Paracetamol Lekarna Ljubljana**

- če ste alergični (preobčutljivi) na paracetamol ali za katerokoli drugo sestavino zdravila,
- če imate redko dedno bolezen rdečih krvničk (pomanjkanje encima glukoza-6-fosfat-dehidrogenaze),
- če imate hudo poslabšano delovanje jeter ali ledvic,
- pri otrocih, mlajših od 6 let.

**Bodite posebno pozorni pri uporabi zdravila Paracetamol Lekarna Ljubljana**

- če imate blago ali zmerno jetno ali ledvično okvaro, se pred uporabo posvetujte z zdravnikom;
- pri dolgotrajnejši uporabi paracetamola lahko nastopijo motnje v delovanju ledvic in jeter, zato je tudi v takem primeru potreben posvet z zdravnikom;
- če ste telesno oslabei npr. zaradi resne obolesti ali hude izgube telesne mase, se pred uporabo posvetujte z zdravnikom.

Zdravilo Paracetamol Lekarna Ljubljana **lahko prikrije znake virusnih, bakterijskih ali glivičnih okužb.**

Zdravilo Paracetamol Lekarna Ljubljana lahko **vpliva tudi na nekatere izvide laboratorijskih preiskav urina**. Če potrebujete preiskavo urina, obvestite zdravnika ali zdravstveno osebo, da ste uporabili zdravilo Paracetamol Lekarna Ljubljana.

**Jemanje drugih zdravil**

Obvestite svojega zdravnika ali farmacevta, **če jemljete ali ste pred kratkim jemali katerokoli zdravilo**, tudi če ste ga dobili brez recepta.

Bodite pozorni na to, da zdravilno učinkovino **paracetamol** vsebujejo tudi nekatera druga zdravila, zato **teh zdravil ne smete uporabljati sočasno** z zdravilom Paracetamol Lekarna Ljubljana, ker lahko presežete največji dovoljeni odmerek paracetamola.

Preden boste uporabili zdravilo Paracetamol Lekarna Ljubljana, se posvetujte z zdravnikom, če jemljete:

- zdravila za zdravljenje epilepsije,
- rifampicin (zdravilo za zdravljenje tuberkuloze),
- zdravila za preprečevanje nastajanja krvnih strdkov.

**Nosečnost in dojenje**

Posvetujte se z zdravnikom ali s farmacevtom, preden vzamete katerokoli zdravilo.

Nosečnice in doječe matere naj ne uporabljajo zdravila Paracetamol Lekarna Ljubljana, razen če jim je tako svetoval zdravnik.

**Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev**

Ni podatkov, da bi uporaba zdravila Paracetamol Lekarna Ljubljana vplivala na sposobnost upravljanja vozil in strojev.

### 3. KAKO UPORABITI ZDRAVILO PARACETAMOL LEKARNA LJUBLJANA

Pri uporabi zdravila natančno upoštevajte zdravnikova navodila. Če ste negotovi se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

**Odmerjanje**

- pri otrocih, starih **od 6 do 9 let: 1 svečka 2- do 3-krat dnevno**,
- pri otrocih, starih **od 9 do 12 let: 1 svečka 3- krat dnevno**,
- pri otrocih, starejših **od 12 let: 1 svečka 3- do 4-krat dnevno**,
- **za odrasle: 1 do 2 svečki 3- do 4-krat dnevno.**

**Največjega priporočenega odmerka ne smete prekoračiti!** Časovni presledek med posameznima odmerkoma mora biti **najmanj 4 ure**. Zdravilo začne delovati v **15 do 60 minutah** in deluje **do 6 ur**.

## Način uporabe

Dvojni trak pretrgajte po zarezi, izluščite svečko in jo vstavite v prazno zadnjično odprtino (danko).

Če ste svečke zmeščane, jih pred pretrganjem ovojnine splaknite z mrzlo vodo ali pustite stati nekaj časa v hladilniku. Ko se strdijo, svečko izluščite in uporabite.

## Trajanje zdravljenja

Zdravilo Paracetamol Lekarna Ljubljana lahko **uporabljate**:

- **največ 3 dni** za zniževanje povišane telesne temperature,
- **največ 5 dni** za lajšanje bolečin.

Če se znaki vaše bolezni v tem času ne izboljšajo ali celo poslabšajo, **se posvetujte z zdravnikom**.

**Če ste uporabili večji odmerek zdravila Paracetamol Lekarna Ljubljana, kot bi smeli**, se TAKOJ POSVETUJTE z zdravnikom ali farmacevtom. Preveliki odmerki lahko povzročijo predvsem slabost, bruhanje in utrujenost.

## Če ste pozabili vzeti zdravilo Paracetamol Lekarna Ljubljana

Če ste pozabili vzeti posamezen odmerek, ga vzemite takoj, ko je to mogoče. Če je že čas za naslednji odmerek, pozabljeni odmerek izpusite. Ne vzemite dvojnega odmerka, če ste pozabili vzeti prejšnji odmerek.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

## 4. MOŽNI NEŽELENI UČINKI

Kot vsa zdravila ima lahko tudi zdravilo Paracetamol Lekarna Ljubljana neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

Neželeni učinki se lahko pojavijo, čeprav ste uporabljali zdravilo pravilno in v priporočenih odmerkih.

Če se pojavijo:

- otekanje grla, ki lahko povzroči težave pri požiranju ali dihanju,
- preobčutljivostne reakcije na koži (rdečica, koprivnica) ali
- porumenelost kože in beločnic,
- slabost in bruhanje,

**prenehajte uporabljati zdravilo in TAKOJ obvestite zdravnika ali poiščite nujno medicinsko pomoč v najbližji bolnišnici.**

Neželeni učinki so razdeljeni po naslednjem sistemu pogostnosti:

**Zelo pogosti:** pojavijo se pri več kot 1 od 10 bolnikov,

**Pogosti:** pojavijo se pri 1 do 10 bolnikih od 100 bolnikov,

**Občasni:** pojavijo se pri 1 do 10 bolnikih od 1.000 bolnikov,

**Redki:** pojavijo se pri 1 do 10 bolnikih od 10.000 bolnikov,

**Zelo redki:** pojavijo se pri manj kot 1 bolniku od 10.000 bolnikov,

**Neznana pogostnost:** pogostnosti iz razpoložljivih podatkov ni mogoče oceniti.

Po uporabi zdravila Paracetamol Lekarna Ljubljana o zelo pogostih, pogostih in občasnih neželenih učinkih ni poročil. Poročali pa so o naslednjih neželenih učinkih:

### Redki

- zlatenica (rumeno obarvanje beločnic, kože in sluznic), povečana aktivnost jetrnih encimov
- preobčutljivostne reakcije na koži (rdečica, koprivnica)
- slabost, bruhanje, lokalno draženje sluznice zadnjika

### Zelo redki ali neznana pogostnost

- oteklina grla
- zmanjšanje števila krvnih ploščic (trombocitopenija),
- zmanjšanje števila belih krvnih celic (levkocitopenija)

Povečane aktivnosti jetrnih encimov, je redek neželen učinek, ki se ga ne občuti, temveč se pokaže pri laboratorijskih preiskavah. Spremenjeno število določenih vrst krvnih celic pa je zelo redek neželen učinek, ki se kaže kot zvišana telesna temperatura, boleče žrelo, nenavadna utrujenost, škrlatne podplutbe ali krvave pikice tik pod kožo, krvavitve iz nosu, krvavitve v ustih in kri v urinu. Spremenjeno število določenih vrst krvnih celic se potrdi s krvnimi preiskavami.

**Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.**

## 5. SHRANJEVANJE IN ROK UPORABNOSTI

### Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Shranjujte pri temperaturi do 25 °C.

Zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na ovojninu.

Datum izteka roka uporabnosti se nanaša na zadnji dan navedenega meseca.

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ko ga ne potrebujemo več, se posvetujte s farmacevtom. Takšni ukrepi pomagajo varovati okolje.

## 6. DODATNE INFORMACIJE

### Kaj vsebuje zdravilo Paracetamol Lekarna Ljubljana

- *Zdravilna učinkovina* je paracetamol. 1 svečka vsebuje 500 mg paracetamola.
- *Pomožna snov* je trda mast.

### Izgled zdravila Paracetamol Lekarna Ljubljana in vsebina pakiranja

Svečke so prosojno bele barve, zašiljene in valjaste oblike.

Škatla vsebuje 10 svečk (2 dvojna trakova s po 5 svečkami).

### Način izdaje zdravila

Izdaja zdravila je brez recepta v lekarnah.

### Izdelovalec

Lekarna Ljubljana PE Galenski laboratorij, Tbilisjska 87, Ljubljana

Navodilo je bilo odobreno: 28.06.2010