

## Navodilo za uporabo

### Strepsils z okusom medu in limone 0,6 mg/1,2 mg pastile amilmetakrezol/2,4-diklorobenzilalkohol

#### **Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!**

Pri uporabi tega zdravila natančno upoštevajte napotke v tem navodilu ali navodila zdravnika ali farmacevta.

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Posvetujte se s farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije ali nasvet.
- Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. Glejte poglavje 4.
- Če se znaki vaše bolezni poslabšajo ali ne izboljšajo v treh dneh, se posvetujte z zdravnikom.

#### **Kaj vsebuje navodilo**

1. Kaj je zdravilo Strepsils z okusom medu in limone in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Strepsils z okusom medu in limone
3. Kako uporabljati zdravilo Strepsils z okusom medu in limone
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Strepsils z okusom medu in limone
6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

#### **1. Kaj je zdravilo Strepsils z okusom medu in limone in za kaj ga uporabljamo**

Amilmetakrezol in 2,4-diklorobenzilalkohol imata antiseptične lastnosti.

Zdravilo Strepsils z okusom medu in limone je namenjeno za ublažitev simptomov vnetja žrela in okužb v ustih in žrelu.

#### **2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Strepsils z okusom medu in limone**

##### **Ne uporabljajte zdravila Strepsils z okusom medu in limone**

- če ste alergični na amilmetakrezol ali 2,4-diklorobenzilalkohol ali katero koli sestavino tega zdravila (navedeno v poglavju 6).
- pri otrocih, mlajših od 6 let.

##### **Opozorila in previdnostni ukrepi**

Pred začetkom uporabe zdravila Strepsils z okusom medu in limone se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Če že dlje časa kašljate ali če ste hripavi, se posvetujte z zdravnikom.

Priporočenih odmerkov zdravila Strepsils z okusom medu in limone ne smete preseči.

Uporabite najmanjši učinkovit odmerek za najkrajše možno trajanje zdravljenja.

Če se znaki bolezni poslabšajo ali ne izboljšajo v treh dneh, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

##### **Druga zdravila in zdravilo Strepsils z okusom medu in limone**

Obvestite zdravnika ali farmacevta, če jemljete, ste pred kratkim jemali ali pa boste morda začeli jemati katero koli drugo zdravilo.

##### **Zdravilo Strepsils z okusom medu in limone skupaj s hrano in pijačo**

Ni znano, da bi hrana in pijača vplivali na učinke zdravila.

### **Nosečnost, dojenje in plodnost**

Če ste noseči ali dojite, menite, da bi lahko bili noseči ali načrtujete zanositev, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom, preden vzamete to zdravilo.

Ker ni dovolj podatkov o varnosti uporabe zdravila Strepsils z okusom medu in limone med nosečnostjo in dojenjem, uporaba v teh obdobjih ni priporočljiva.

Podatki o vplivu zdravila Strepsils z okusom medu in limone na plodnost niso na voljo.

### **Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev**

Ni znano, da bi zdravilo vplivalo na sposobnost upravljanja vozil in strojev.

### **Zdravilo Strepsils z okusom medu in limone vsebuje glukozo in saharozo**

Če vam je zdravnik povedal, da ne prenašate nekaterih sladkorjev, se pred uporabo tega zdravila posvetujte z zdravnikom.

## **3. Kako uporabljati zdravilo Strepsils z okusom medu in limone**

Pri uporabi tega zdravila natančno upoštevajte napotke v tem navodilu ali navodila zdravnika ali farmacevta. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Priporočeni odmerek je:

Odrasli: na 2 do 3 ure v ustih počasi raztopite eno pastilo.

Največji dnevni odmerek zdravila je 12 pastil.

### **Uporaba pri otrocih in mladostnikih**

Otroci, starejši od 6 let, in mladostniki: na 2 do 3 ure v ustih počasi raztopite eno pastilo. Največji dnevni odmerek zdravila je 6 pastil.

**Zdravilo ni primerno za otroke, mlajše od 6 let.**

Starostniki: posebno prilagajanje odmerka ni potrebno.

Neposredno po uporabi zdravila ne uživajte hrane ali pijače, da le-ta ne bi pospešila odstranjevanja zdravila z ustne sluznice in žrela.

Če menite, da je učinek zdravila premočan ali prešibak, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

### **Če ste uporabili večji odmerek zdravila Strepsils z okusom medu in limone, kot bi smeli**

Če ste uporabili večji odmerek zdravila, kot bi smeli, se takoj posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Preveliko odmerjanje lahko povzroči želodčne in črevesne težave.

### **Če ste pozabili uporabiti zdravilo Strepsils z okusom medu in limone**

Ne vzemite dvojnega odmerka, če ste pozabili vzeti prejšnji odmerek.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

## **4. Možni neželeni učinki**

Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

Spodnji seznam neželenih učinkov se nanaša na kratkotrajno uporabo zdravila Strepsils z okusom medu in limone. V primeru dolgotrajnega zdravljenja kroničnih težav se lahko pojavijo dodatni neželeni učinki.

Možni neželeni učinki, ki se lahko pojavijo:

**Občasni** (pojavijo se lahko pri največ 1 od 100 bolnikov):

- preobčutljivost, otekanje ust in žrela, draženje žrela, mravljinčenje v ustih, neprijeten občutek v ustih, izpuščaj

**Redki** (pojavijo se lahko pri največ 1 od 1.000 bolnikov):

- pekoča bolečina v jeziku

**Zelo redki** (pojavijo se lahko pri največ 1 od 10.000 bolnikov):

- prebavne motnje, slabost

**Neznana pogostnost** (ni mogoče oceniti iz razpoložljivih podatkov):

- bolečina v trebuhu

### **Poročanje o neželenih učinkih**

Če opazite katerega koli izmed neželenih učinkov, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. O neželenih učinkih lahko poročate tudi neposredno na

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke

Sektor za farmakovigilanco

Nacionalni center za farmakovigilanco

Slovenčeva ulica 22

SI-1000 Ljubljana

Tel: +386 (0)8 2000 500

Faks: +386 (0)8 2000 510

e-pošta: [h-farmakovigilanca@jazmp.si](mailto:h-farmakovigilanca@jazmp.si)

spletna stran: [www.jazmp.si](http://www.jazmp.si).

S tem, ko poročate o neželenih učinkih, lahko prispevate k zagotovitvi več informacij o varnosti tega zdravila.

## **5. Shranjevanje zdravila Strepsils z okusom medu in limone**

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na škatli poleg oznake "Uporabno do:". Rok uporabnosti zdravila se izteče na zadnji dan navedenega meseca.

Zdravilo shranjujte pri temperaturi do 25 °C.

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne uporabljate več, se posvetujte s farmacevtom. Taki ukrepi pomagajo varovati okolje.

## **6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije**

### **Kaj vsebuje zdravilo Strepsils z okusom medu in limone**

- Zdravilni učinkovini sta amilmetakrezol in 2,4-diklorobenzilalkohol. Ena pastila vsebuje 0,6 mg amilmetakrezola in 1,2 mg 2,4-diklorobenzilalkohola.
- Druge sestavine zdravila so: med, vinska kislina, eterično olje poprove mete, eterično olje limone brez terpenov, kinolinsko rumeno (E104), tekoča glukoza in tekoča saharoza.

### **Izgled zdravila Strepsils z okusom medu in limone in vsebina pakiranja**

Zdravilo Strepsils z okusom medu in limone je na voljo v obliki rumenih, okroglih pastil s Strepsils "S" zaščitnim znakom na obeh straneh.

Na voljo je v škatli iz pločevine z 12 pastilami (1 x 12 pastil v pretisnem omotu iz PVC/PVDC in aluminijaste folije) in v kartonski škatli s 24 pastilami (2 x 12 pastil v pretisnem omotu iz PVC/PVDC in aluminijaste folije).

Na trgu morda ni vseh navedenih pakiranj.

#### **Način izdajanja zdravila**

Izdaja zdravila je brez recepta v lekarnah in specializiranih prodajalnah.

#### **Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom in proizvajalec**

##### **Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom**

Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd., 103-105 Bath Road, Slough, Berkshire SL1 3UH, Velika Britanija

##### **Proizvajalec**

Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd., Thane Road, Nottingham, NG90 2DB, Velika Britanija

RB NL Brands B.V., Schiphol Boulevard 207, 1118 BH Schiphol, Nizozemska

Za vse morebitne nadaljnje informacije o tem zdravilu se lahko obrnete na podjetje PharmaSwiss d.o.o, Brodišče 32, 1236 Trzin, ki je odgovorno za trženje zdravila v Sloveniji.

**Navodilo je bilo nazadnje revidirano dne 6. 6. 2019**